# 王氏醫案

才不足以包乎所業之外則其業不精心不足以周乎所業之中則其業亦不精羿之射僚之丸張旭之草書蘭子之舞劍其人皆負不可一世之才而俯首降心於一藝之微研窮玩索不能自已迨其業之旣成而天下莫能尙况乎醫之爲道參天人之奥操性命之權其理至深其責至重而世顧以無才無識之人挾不專不精之術貿貿施治絕人長年宜乎古人有學醫人費之慨也余自束髮受書篤嗜軒岐之學以家貧無力致書所蓄者靈素而外立齋景岳諸種而已覩其援引之繁富議論之辨博竊以爲道在於是而按法施治輒爲所困嗣得西昌喻氏

之書伏而誦之始有以識夫病情之番變方劑之準繩與夫寒暑陰陽之變化其才大而學博識高而法密有非薛張諸公所能髣髴者然而尙論一編猶襲三綱之謬春溫一論混入傷寒之中白璧微瑕不能不爲此老惜也歲在乙巳服官江右廣搜百氏之書如葉天士之高超尤在涇之切實王晉三之精與張路玉之明達以及吳又可徐洄溪柯韻柏陳修園諸君子罔弗各具精心獨抒偉論靈蘭之祕闢發靡遺然而宗古訓者矩矱弗失而不免於附會穿鑿崇妙悟者化裁生心而或涉於支離背謬夫醫主於愈病而已偏執一途而故持高論縱名理湛深

與病情無與也偶於坊間得武林王君孟英所著霍亂論一帙其理明其詞達指陳病機判然若黑白之不可混淆以爲飼鶴山人之流亞私心竊嚮往之己酉冬余室人患痰飲脇痛屢藥弗痊漸卽沈困適孟英來攜之金豁視吳侯醒香之疾亟走伻相邀惴惴然恐不得一當乃孟英惠然肯來投藥五劑而大效並出初刊醫案回春錄見示因縱談古今之同異百家之得失滔滔滾滾折衷悉當始知霍亂一論不過孟英一端之緒餘而又竊幸余向之私心傾慕者爲不誣也詢其近案積有數卷乃張柳吟趙菊齋諸君子所輯定而題其篇曰仁術志余取而讀

之喜其崇論閎議足爲世法因易其名曰王氏醫案與回春錄合爲一編而附霍亂論於後并謬加評點付諸攻木之工以廣其傳蓋醫者生人之術也醫而無術則不足以生人醫而悞用其術則不惟不足以生人而其弊反至於殺人夫醫雖至庸未有忍於殺人者也而才不足以應紛紜之變學不足以窮古今之宜識不足以定眞僞之幻則其術不精斯日殺人而不自知故爲醫而無才無學無識不可也爲醫而恃才恃學恃識亦不可也必也平心以察之虛心以應之庶乎其可也夫古人因病而生法因法而成方理勢自然本非神妙唯用之而當斯神妙

矣今才如孟英學如孟英識力精超如孟英而每臨一證息心
靜氣曲證旁參務有以究乎病情之眞而後已宜乎出奇制勝
變化無方著之醫案卓卓可傳如是也余讀孟英之書於數年
以前以爲迢迢二千里山遙水阻必無相見之期乃吳君病而
孟英來孟英來而余室適病宛轉牽引卒使數年來望風相思
之友把袂盤桓傾吐肝鬲極苦岑遇合之奇夙世因緣諒非淺
鮮孟英勉乎哉異日者擷衆籍之精華訂羣言之謬僞删繁提
要勒爲一書以保全天下萬世之民命厥功甚鉅而爲力亦甚
艱天末故人所企望於良友者詎止斯醫案一編而已耶

道光三十年歲次庚戌知宜黃縣事楊照藜書於吟香書屋

予友王君孟英少年失怙其尊人彌留之際執孟英手而囑曰
人生天地之閒必期有用於世汝識斯言吾無憾矣孟英泣拜
而銘諸心版然自顧家貧性介不能爲利達之人將何以爲世
用耶聞先哲有不爲良相則爲良醫之語因自顏其室曰潛齋
而銳志於軒岐之學潛心研究遂抉其微年未冠遊長山即納
交於予每見其治病之奇若有天授而覘疾之暇恒手一編不
輟也繼瞻其齋頭一聯云讀書明理好學虛心可見苦志力學
蘊之胷中者淵深莫測乃能窮理盡性出之指下者神妙難言
二十年來活人無算豈非以用世之才運其濟世之術而可垂

諸後世者哉今就予耳目所及之妙法仿丁長孺刻仲淳案之例錄而付梓名曰回春錄見聞有限追美極多世之君子必有如莊斂之華岫雲其人者更爲之遠搜博采以廣其傳而予穢秕在前有榮施矣

道光二十三年癸卯冬十二月　愚弟周　鑅拜題

例言

一所錄皆二十年來見聞所及詳載字姓歷歷可徵閒有逸其名氏者偶忘之耳

一淺易之證尋常治法所能瘳者概不泛錄

一難辨之證誤藥卽成危候而初病乃能洞燭遽爾霍然雖若無奇不可不錄後學苟能留意庶免以藥釀病之辜

一病有虛實寒熱治分補瀉溫凉更有補瀉互投之法寒熱並用之宜者以標本異情證因錯雜也此錄諸案具備法無偏倚不媿一代之良工矣


一六氣皆從火化凡外感之邪雖傷寒必以顧陰爲主况温熱暑燥之病更多於傷寒而熱之灼陰尤爲勢所必然耶觀案中治感多以凉潤清解爲法是參天人一致之理以談醫非泥古耳食之徒所能窺測也

一孟英可傳之案何僅止此惜予未能窮蒐廣討也凡荷其再造之人不妨陸續補刊以推廣仁術而嘉惠來茲匪惟忠厚當然卽是心存濟世故不以上下分帙而以卷一卷二爲次蓋欲卷數之遞增無己耳

一案中辨證固多發人之未發他如論阿片之燥烈傷津豬肉

之柔潤充液之類尤爲有功於世是不僅某藥治愈某病之案讀者須加咀嚼勿囫圇嚥下也

一孟英雖用藥極平淡而治病多奇中故其辨證處方同道莫不折服茲所錄案已見一斑附采玉芝丸數方藥易功優更徵立法之善至爛喉痧方雖從金匱㝬錄出而孟英命其名曰錫類散且闡授其方於莊芝階金愿谷兩中翰修合濟人救全不少凡屬外淫喉患無不應手而瘳不特爛喉痧藉以爲神丹也敢不附載以廣其傳乎



乾薑辛溫故用之以回陽氣若併此不得則令壯盛人以氣呵之亦可救倉卒之疑

# 王氏醫案卷一 原名回春錄

杭州王士雄孟英著

同郡周　鑅光遠輯錄

甲申夏予於登廁時忽然體冷汗出氣怯神疲孟英視之曰陽氣欲脫也卒不及得藥適有三年女佩薑一塊約重四五錢急煎而灌之即安後用培補藥率以參耆朮草爲主蓋氣分偏虛也

范慶簪年踰五十素患痰嗽乙酉秋在婺驟然吐血勢頗可危孟英診曰氣虛而血無統攝也雖向來咳嗽陰虧陰藥切不可

服然非格陽吐血附桂更爲禁劑乃以潞參耆朮苓草山藥扁豆橘皮木瓜酒炒芍藥爲方五帖而安繼去甘草木瓜加熟地黃黑驢皮膠紫石英麥冬五味子龍骨牡蠣熬膏服之全愈亦不復發後范旋里數年以他疾終

丙戌春倉夫鄭德順患急證時已二鼓丏孟英視之見其扒牀拉席口不能言惟以兩手指心抓舌而已孟英曰中毒也取綠豆二升急火煎清湯澄冷灌之果即霍然詰朝詢其故始言久患臂痛因餌草頭藥下嚥後卽心悶不可耐舌麻不能言而旁人不知也錄此足以徵孟英臨證之燭照如神亦可見草藥之

予每以此法治陽諸瘡痔莫不應手取效眞妙方也

不可輕試也

婺人羅元奎丁亥夏卒發寒熱旋卽嘔吐不能立自言膀胱痛不可當孟英視其痛處焮赤腫硬形如肥皂莢橫梗於毛際之左乃曰此證頗惡然乘初起可一擊去之也用金銀花六兩生甘草一兩皁角刺五錢水煎和酒服之一劑減其勢再劑病若失逾年患傷寒孟英切脈虛細已極曰此不可徒攻其病者以陰分太虧耳與景岳法以熟地當歸酒炒白芍炙甘草橘皮柴胡等藥一劑而瘳（此法予亦屢用獲效氣虛者并可加參但表藥止柴胡一味猶嫌力微）

子素患噫氣凡體稍不適其病卽至旣響且多勢不可遏戊子

法本喻氏

元參能滋水以制火獨用則力厚取效倍捷

冬發之最甚苦不可言孟英曰此陽氣式微而濁陰上逆也先服理中湯一劑隨以旋覆代赭湯投之遂愈嗣後每發如法服之輒效後來發亦極輕今已不甚發矣予聞孟英常云此仲聖妙方藥極平淡奈世人畏不敢用殊可陋也

有患陰虛火炎者面赤常如飲酒之態非戴陽證孟英主一味元參湯其效若神而屢試皆驗

黟人葉殿和庚寅秋患感旬日後汗出昏瞀熱甚陰竭之象醫皆束手乃錫余薇垣浼孟英勘之曰此真陰素虧過服升散與仲聖誤發少陰比例精當汗同例下竭則上厥豈得引亡陽爲比而以附桂速其斃耶以

元參地黃知母甘草白芍黃連茯苓小麥龜板鼈甲牡蠣驢皮膠為大劑投之得愈

海陽趙子升辛卯夏病瘧急延孟英診之曰暑熱為患耳不可膠守於小柴胡也與白虎湯一啜而瘥（專清暑邪）甲午秋范麗門患溫瘧孟英用白虎加桂枝以痊之（清熱兼驅風）丙申夏盛少雲病溼熱瘧孟英以白虎加蒼朮湯而安（清熱兼燥溼）己亥夏予舅母患瘧服柴胡藥二三帖後汗出昏厥妄語遺溺或謂其體質素虛慮有脫變勸服獨參湯幸表弟壽者不敢遽進乃邀孟英商焉切其脈洪大滑數曰陽明暑瘧也與傷寒三陽合病同符處竹葉石膏湯（清熱兼養氣）兩劑而瘳康

、予夏滇人黃肖農自福清赴都道出武林患暑瘧孟英投白虎湯加西洋參數帖始愈（清熱益氣與前方意同）辛丑秋顧味吾室人病癉瘧孟英亦主是方而效莊芝階中翰張安人年踰花甲瘧熱甚熾孟英審視再四亦與竹葉石膏湯而安聞者無不驚異予謂如此數證體分南北質有壯衰苟非識證之明焉能藥與病相當而用皆適宜哉

壬辰八月范蔚然患感旬餘諸醫束手乃弟麗門懇孟英治之見其氣促音微呃忒自汗飲水下嚥隨卽傾吐無餘曰伏暑在肺必由溫散以致劇也蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失

妙論不獨治暑為然凡上而不下之證皆可類推

其順降之機即水精四布亦賴清肅之權以主之氣既逆而上奔水亦泛而上溢矣但清其肺則諸恙自安乃閱前服諸方始則柴葛羌防以升提之火藉風威吐逆不已猶謂其胃中有寒也改用桂枝乾薑以溫燥之火上添油肺津欲絕自然氣促音微疑其虛陽將脫也徑與參歸蛤蚧柿蒂丁香以補而納之愈補愈逆邪愈不出欲其愈也難矣亟屏前藥以瀉白散合清燥救肺湯數服而平

一何叟年近八旬冬月傷風有面赤氣逆煩躁不安之象孟英曰此喻氏所謂傷風亦有戴陽證也不可藐視以東洋人參細

金不換正氣散
蒼朮 厚朴 陳皮
藿香 甘草 半夏
或加香豉

辛炙甘草熟附片白朮白芍茯苓乾薑五味胡桃肉細茶葱白一劑而瘳孟英曰此眞陽素擾痰飲內動衞陽不固風邪外入有根蒂欲拔之虞誤投表散一汗亡陽故以眞武四逆諸法回（以此二語印證前方）陽鎭飲攝外安內以爲劑也不可輕試於人致干操刃之辜愼（可知用法之周到）之愼之

癸巳秋予在婺患瘧大爲醫人所誤初則表散繼則滋補延及月餘肌肉盡削寒熱不休且善嘔惡食溺赤畏冷乃買棹旋杭託孟英診視曰足太陰溼瘧也以金不換正氣散三啜而安然元氣爲誤藥所傷多方調補甫得康健次年秋復患瘧於婺友

人咸舉醫療于概卻之憶病情與前無異卽於篋中檢得孟英原方按序三帖病亦霍然聞者無不稱歎後歸里爲孟英述而謝之孟英曰瘧情如是恐其按年而作乃授崇土勝溼丸方明年夏令預服以堵禦之迄秋果無恙後竟不發矣

鍾耀輝年踰花甲在都患腫起自腎囊氣逆便溏諸治不效急買車返杭託所親謝金堂邀孟英治之切其脈微而弱（[illegible]）詢其溺清且長曰都中所服其五苓八正耶抑腎氣五皮也鍾云誠如（此卽[illegible]所）君言徧嘗之矣而病反日劇者何哉孟英曰此土虛不制水也（云渠中加茯苓附子之謂也）通利無功滋陰亦謬法宜補土勝溼與大劑參朮果卽向安越

入載以他疾終。

金元章媳於甲午新寡後患膿窠疥。大抵溼熱之病耳。瘍醫連某疑爲遺毒。徑作廣瘡療。漸至上吐下利。不進飲食。另從內科治亦無寸效。延至未春。更兼腹痛自汗。汎惡肌削。諸醫皆見而卻走矣。王仲安薦孟英視之。曰此胃氣爲苦寒所敗。肝陽爲辛熱所煽。前此每服陽剛。即如昏冒。稍投滋膩。泄瀉必增。遂謂不治之證。未免輕棄。乃以四君子加左金椒梅蓮子木瓜餘糧石脂等出入爲方。百日而愈。第信猶未轉也。諸親友環議再不通經。病必有變。孟英力辨此非經阻可通之證。惟有培養生化之

源使其氣旺血生則流行自裕若不揣其本而齊其末則[illegible][illegible]不能榨油徒傷正氣盡隳前功豈不可惜衆議始息恪守其方服至仲冬天癸至而肌肉充康復如常矣

朱某患嘔吐諸藥不效甚至大小便祕糞從口出臭不可當自問不起矣孟英用代赭旋覆湯加蜣螂蟲服之而愈上者下之之法亦最奇巧

孟英邃於醫學從不侈談脈理足以見其歛然不自足也而脈理之最不易切者莫如妊娠予聞孟英於乙未春診黃履吉室人之脈曰妊也是月天癸猶來人皆不以爲然次月仍轉但不多耳復邀孟英診之曰果妊也汛不斷者蔭胎之血有餘耳[illegible]

娠孕之脈最爲難憑有初娠卽現於脈者有三四月始現於脈者有始終不現於脈者此與憑脈斷證有時可憑有時不足憑同一至理予嘗以此質之孟英孟英亦以爲然可見眞學問人必不恃虛言以眩世也

月汛復行。覺更少矣。人猶以爲妄也。四月後經始停。娠亦顯。娩如期。人始服其見老。丙申夏、滿洲某選粵東鹽場攜眷之任。過浙、主於李雲臺家。請孟英視其如君之恙。孟英診曰非病也。熊羆入夢矣。某頗不信。謂經甫停。何以遽斷爲孕。而又必其爲男乎。反生言過其實之疑。旣而某延雲臺入幕。偕赴粵任。次年雲臺於家書中述及居停果得子。深歎孟英指妙。予荆人久無孕、辛丑秋、汛事偶愆、孟英一診卽以妊斷、且以男許。次夏果舉一子。惜不育耳。邵魚竹給諫仲媳懷妊、孟英於寅春初診卽許抱孫。秋杪果應。表弟胡壽者室。偶有小忿。經事濇少。腰腹微脹。自

以爲怒氣所滯也。延孟英調之。切其脈曰。懷麟矣。初猶疑之。既而始信。卯春果弄璋。吳雲階室。年四十餘。寅秋汛斷。其腹日脹。醫謂病也。治之罔效。延孟英診之。孕也。彼猶不自信。及腹中漸動。始服其言。至期產一女。癸秋孟英治石誦羲室。脘痛甫愈。適汛。踰期。卽曰。娠矣。既而果日形著。其指下之神妙如此。

朱恒山久患胸痞。多痰。諸藥罔瘳。孟英診曰。清陽之氣不司旋運也。與參耆苓朮之劑。豁然頓愈。因極欽服。後數年果以汗脫。聞其垂危之際。口不能言。猶以左手橫三指。右手伸一指。加於上作王字狀。以示家人。有會其意者。急追孟英至。而他醫之中

風藥早灌入矣遂以長逝癸卯冬至前一日管大中丞亦是氣從溺脫當以參附挽回者及孟英至而痰藥痧藥風藥灌之徧矣脈僅若蛛絲過指孟英堅不與方須臾而卒

無棣張柳吟封翁於乙未夏偕令嗣恒齋刺史赴滇南任道出武林其家人鄭九者封翁寵人之弟也途次抱恙抵杭日招越醫陳六順診治服藥後汗出昏狂精流欲脫封翁大駭躬詣孟英以希挽救孟英切其脈既數且亂沈取極細乃語封翁曰此證頗危生機僅存一綫亦斯人之陰分素虧不可竟謂附桂之罪也封翁聞言大悅曰長者也不斥前手之非以自伐不以見

證之險而要譽相見恨晚遂訂忘年之交彼此盡吐生平始知封翁最喜談醫岐黃之言無所不覽惟不肯爲人勘病亦愼重之意耳於是孟英以元參知蘗桑枝龍牡生地白芍甘草百合石斛梔子鹽水炒淡豆豉爲大劑灌之下嚥卽安次日去梔豉甘草加龜板鼈甲鹽水炒橘紅十餘帖而康

吳馥齋令姊稟質素弱幼時鳳山診之許其不秀癸巳失其怙恃情懷悒悒汛事漸愆寢食皆廢肌瘦吞酸勢極可畏孟英以（甘以緩之苦以降之酸以斂之皆古聖之良法也）高麗參鹽水炒黃連甘草小麥紅棗百合茯苓牡蠣白芍旋覆花新絳等治之各恙漸已繼參歸地滋陰康強竟勝於昔

一男子患喉痺。專科治之。甫愈而通身腫勢日甚。醫者驚走。孟英診之曰。病藥也。投附子、理中湯數劑而痊。予謂喉痺治以寒涼。法原不謬。而藥過於病。翻成溫補之證。是病於藥也。非病於病也。嘗聞孟英云。病於病而死者十之三。病於藥而死者十之七。以予觀之。誠非激論也。吁可歎已。

朱氏婦產後惡露不行。而宿哮頓發。專是科者不能下手。孟英以丹參、桃仁、貝母、茯苓、滑石、花粉、桂枝、通草、蛤殼、苡仁、紫菀、山查、絲瓜子、茺蔚子、旋覆、琥珀、出入爲方。三日而愈。

局醫黃秀元之輿人韓名諒者。有兒婦重身患熱病。局中諸醫。

皆慮胎隕率以補血爲方旬日後勢已垂危浼人求孟英診之曰胎早腐矣宜急下之或可獲幸若欲保胎則吾不知也其家力懇疏方遂以調胃承氣合犀角地黃湯加西洋參麥冬知母石斛牛膝投之胎落果已臭爛而神氣即清熱亦漸緩次與西洋參元參生地知母麥冬丹參丹皮茯苓山查石斛豆卷茺蔚琥珀等藥調之粥食日加旬餘而愈

一少年驟患遺精數日後形肉大脫連服滋陰濇精之藥如水投石孟英與桂枝湯加參耆龍牡服下即效匝月而瘳此陰浮於上陰孤於下故非滋陰濇精所能治仲景桂枝龍骨牡蠣湯能調和陰陽收攝精氣又益參耆以建其中故取效甚速

家叔南山於秋間患感日治日劇漸至神昏譫妄肢振動惕施

泰兩醫皆謂元虛欲脫議投峻補家慈聞而疑之曰盍與孟英商之孟英診曰無恐也通絡蠲痰可以即愈用石菖蒲羚羊角絲瓜絡冬瓜子苡仁桑枝旋覆橘絡葱鬚貝母鈎藤膽星爲劑化服萬氏牛黃淸心丸一顆覆杯即安調理半月而愈

美政關毛內使年踰花甲而患喘嗽醫與腎氣湯全鹿丸等藥反致小溲濇痛病日以劇孟英診之與純陰壯水之治毛曰我輩向吸阿片煙豈敢服此凉藥孟英曰此齊東之野語也誤盡天下蒼生幸汝一問吾當爲世人道破機關不致誤墮火坑者再爲積薪貯油之舉也夫阿片本罌粟花之脂液性味溫澀而

又產於南夷之熱地。煎釀以成土。熬煎而爲膏。吸其煙時。還須火煉。燥熱毒烈。不亞於砒。久吸之令人枯槁。豈非燥烈傷陰之明驗哉。毛極拜服。果得霍然。或問曰。阿片之性。殆與酒相近乎。孟英曰。麴蘖之性雖熱。然人飲之則質仍化水。故陰虛者飲之則傷陰。陽虛者飲之則傷陽。景岳論之詳矣。若阿片雖具水土之質。而性從火變。且人吸之則質化爲煙。純乎火之氣。陖直行清道。爍人津液。故吸煙之後。口必作渴。久吸則津枯液竭。精血源窮。而宗筋失潤。人因見其陽痿也。不察其所以痿之故。遂指阿片爲性冷之物。抑何愚耶。凡吸阿片煙而醉者。以陳醬少許

淪湯服卽醒若熬煙時少著以鹽卽渙散不凝膏吸時舌上預舐以鹽則不成癮雖癮深者但令舐鹽而吸則癮自斷豈非潤下之精能制炎上之毒乎

金元章年踰七旬久患疝厥每病於冬以爲寒也服熱藥而暫愈終不能霍然孟英診曰脾腎雖寒肝陽內盛徒服剛烈焉能中肯以參朮枸杞蓯蓉茴香當歸菟絲鹿角霜桂茯苓楝實黃連吳萸橘核等藥爲方服之今數年無恙矣

丙申春蜀人石符生將赴鄧雲厓司馬之招經杭抱病僑於張柳吟之舊館亦爲寓側陳六順治困居停主人知之卽告以柳

吟僕病之事石聞之悚然亟遣人延孟英診焉脈沈而澀滯模糊不分至數肢涼畏冷涎沫上涌二便澀少神氣不爽曰此途次感風溼之邪失於解散已從熱化加以溫補致氣機愈形窒塞邪熱漫無出路必致爍液成痰逆行而上但與舒展氣機則痰行熱降諸恙自瘳矣以黃連黃芩枳實橘皮梔子淡豉桔梗杏仁貝母鬱金通草紫菀竹茹蘆菔汁等藥三服而起調理匝旬遂愈

夏間王某患感越醫謝樹金治之病雖退而能食矣但不能起坐類乎癱瘓延已月餘人皆謂其成廢所親鍾某浼孟英視之

曰此多服表散汗出過分氣血兩傷肢骸失其營養脈微而細（氣血雙補兩補血之藥血貫補氣以汗為血）舌亮無苔（液陰分傷也）與大劑參耆歸朮熟地杜仲菟絲牛膝枸杞山藥木瓜萸肉萎蕤續斷桑枝數十帖而起

一勞力人陰分素虧驟感風溼兩膝刺痛痠耎不能稍立（此證延久將成鶴膝風）孟英以六味地黃湯加獨活豆卷（精當）一劑知二劑已（敘證詳明）

張養之令正飲食如常而肌膚消瘦信事如期而紫淡不恆兩髀發熱而別處仍和面色青黃而隱隱有黑氣儼似虛寒多藥不效始逆孟英診之脈似虛細而沈分略形紘滑曰此陽明有餘少陰不足土燥水涸仲聖有急下存陰之法然彼外感也有

孟英善用甘寒投之此證尤宜

餘之邪可以直瀉此內傷也無形之熱宜以甘寒義雖同而藥則異也贈以西洋參生地生白芍生石膏知檗芩梔麥冬花粉楝實丹皮木通天冬諸品服至數斤黑氣退而肌漸充胖熱去而經亦調矣

姚氏婦產後昏譫汗厥肌膚浮腫醫投補虛破血祛祟安神之藥皆不能治舉家惶怖轉延孟英診焉詢知惡露仍行曰此證醫家必以為奇病其實易愈也昔金尚陶先生曾治一人與此相似載於沈堯夫女科輯要中方用石菖蒲膽星旋覆茯苓橘紅半夏麴名蠲飲六神湯凡產後惡露行而昏譫者多屬痰飲

不可誤投攻補此湯最著神效如方服之良愈

牙行王炳華妻患舌瘡痛礙飲食內治外敷皆不效孟英視其舌色紅潤脈形空數曰此血虛火浮也以產後發熱例施之用熟地當歸酒炒白芍炙甘草茯苓炮薑投之其病如失

一老人霍亂後目閉呃忒醫謂脫陷在即與桂附回陽之藥業已煎矣適孟英至詢知溺赤口乾診得脈形與數而藥香撲鼻即曰此藥中有肉桂叟勿服也服之必死迫令將藥傾潑而與肅肺清胃之劑果得漸安

丁酉中秋夜牙行張鑑錄年踰花甲卒仆於地急延孟英脈之

弦滑而大曰痰氣食相併而逆於上也先以烏梅擦開牙關橫一竹箸於口灌以淡鹽薑湯隨入鵞翎探之吐出痰食太息一聲而甦次與調氣和中而愈後數年以他疾終此案雖無奇而辨證之明不可不錄

姚樹庭以古稀之年而患久瀉羣醫雜治不效食以爲不起矣延至季秋邀孟英決行期之早晚非敢望愈也孟英曰絃象獨見於右關按之極弱乃土虛木賊也調治得法猶可引年何以遽爾束手乎乃出從前諸方閱之皆主溫補升陽曰理原不背義則未盡耳如薑附肉蔻骨脂之類氣熱味辣雖能溫臟反助

前語精義由此觀推可以知用藥之權衡矣

肝陽肝愈強則脾愈受戕且辛走氣而性能通泄與脫者收之之義大相刺謬而鹿茸升麻可治氣陷之瀉而非斡旋樞機之品至熟地味厚滋陰更非土受木尅脾失健行之所宜縱加砂仁酒炒終不能革其膩滑之性方方用之無怪乎愈服愈瀉徒

扶脾抑肝加以收攝下焦須

藉景岳窮必及腎為口實也與異功散加山藥扁豆蓮子烏梅

若其與病証針鋒相對處

木瓜芍藥蒺藜石脂餘糧服之果效恪守百日竟得康強越三載以他疾終

戊戌春張雨農司馬必欲孟英再赴環山孟英因其受病之深且公事掣肘心境不能泰然誠非藥石之可以為力也固辭不

往司馬泣然哀懇。但冀偕行。旋署則任君去留可耳。弁嚼翹顧
舟再四。代陳曲悃。孟英感其情。同舟渡江。次剡溪。司馬譚及體
氣羸憊情形。孟英忽曰。公其久不作嚏乎。司馬曰。誠然有年矣。
此曷故也。孟英曰。是陽氣之不宣布耳。古惟仲景論及之。然未
立治法。今擬鄙方奉贈。博公一嚏如何。司馬稱善。遂以高麗人
參、乾薑、五味、石菖蒲、酒炒薤白、半夏、橘皮、紫菀、桔梗、甘草爲劑。
舟行抵嵊。登陸取藥。煎而服之。駕輿以行。未及二十里。司馬命
從人詣孟英車前報曰。已得嚏矣。其用藥之妙如此。
夏間牙行倪懷周室。新產數日。泄瀉自汗。嘔吐不納。專科謂犯

三禁不敢肩任孟英診脈虛微欲絕證極可虞宜急補之遲不及矣用東洋參耆朮龍牡酒炒白芍桑枝木瓜扁豆茯神橘皮紫石英黑大豆投之四劑漸以向安予謂新產後用參耆大補而又當盛夏之時非有眞知灼見者不能也誠以天下之病千變萬化原無一定之治奈耳食之徒惟知執死方以治活病豈非造孽無窮亦何苦人人皆欲爲醫而自取罪戾耶

張養之令姪女患汛愆而飲食漸減于某與通經藥服之尤惡穀請孟英診之脈緩滑曰此痰氣凝滯經隧不宣病由安坐不勞法以豁痰流氣勿投血藥經自流通于某聞而笑曰其人從

不吐痰血有病而妄治其氣脹病可立待也及服孟英藥果漸吐痰而病遂愈養之大爲折服予謂世人頭痛治頭腳疼療腳偶中而愈貪爲己功誤藥而亡寃將奚白此寓意草之所以首列議病之訓也孟英深得力於喻氏故其議病迴出凡流要知識見之超總由讀書而得雖然人存政舉未易言也

毛允之戊冬患感初治以溫散繼卽以滋陰病日以劇延至亥春或疑爲百日之勞或謂是傷寒壞證而鳳山僧主升柴耆朮以補之丁卯橋用輕粉巴霜以下之雜藥徧投形神日瘁乃尊學周延孟英視之脈來澀數上溢呃忒口膩雖覺嗜飲而水難

下膈頻吐涎沫便祕溺赤潮熱往來少腹如烙按之亦不堅滿曰此病原屬冬溫治以表散則津液傷而熱乃熾繼以滋塡熱邪愈錮再施溫補氣機更窒升柴耆朮欲升其清而反助其逆巴霜輕粉欲降其濁而盡刦其陰病及三月發熱不是表邪便祕旬餘結濇非關積滯且脈澀為津液之已傷數是熱邪之留著溢乃氣機為熱邪所壅而不得下行豈非溫邪未去得補而膠固難除徒使其內燥眞陰上熏清道以致一身之氣盡失肅清之令法當搜剔餘邪使熱去津存即是培元之道伸其治節俾濁氣下趨乃為宣達之機何必執參茸為補虛指硝黃為通

清熱生津治法固善然亦此人本元堅固故屢誤之後猶能挽回否則亦難爲力矣

祛痰清熱滋陰鎭墜力量甚大此必本虛標實者故其方如此

降哉以北沙參柴菀麥冬知母花粉甘草石斛丹皮黃芩桑葉卮子黃連木通銀花橘皮竹茹蘆根橄欖枇杷葉地栗海蛇等出入爲方服之各恙遞減糜粥漸加半月後始得大解而腹熱全消穀食亦安乃與滋陰善後而愈

張養之所親李某戊冬醉飲夜歸爲查段巡員所嚇神志卽以漸昏治之罔效至於不避親疎裸衣笑罵力大無制糞穢不知己夏延孟英視之用石菖蒲遠志龍齒龜板犀角羚羊角元參丹參知母卮子龍膽草枳實黃連竹黃竹瀝石膏赭石黑鉛鐵落出入爲方十餘帖吐瀉膠痰甚多繼與磁硃丸漸以向愈

一視叟年近古稀己亥春赴席忽仆地痰涌肢强眼斜舌蹇不語外科王瑞芝薦孟英視之（扶脾抑肝舉痰面面圖到）投六君子加蠍稍羚羊角膽星石菖蒲竹瀝薑汁而瘳

茅家埠翁嘉潤患腰疽愈而復發者五年費用不貲諸瘍醫治之不效盛少雲囑其求治於孟英切其脈絃細以數曰子之幸也（腎虛發亦然）此內損證外科惡乎知與大劑甘潤滋塡之藥匝月而痊至今不發

胡琴泉舅氏家一潘嫗年踰古稀患霍亂轉筋瀕危孟英用自制蠶矢湯而瘳

一少婦分娩胞水早破胎澀不能下俗謂之瀝漿生催生藥遍試不應孟英令買鮮豬肉一二斤洗淨切大塊急火煎湯吹去浮油恣飲之即產母子皆生且云豬爲水畜其肉最腴大補腎陰而生津液予嘗用治腎水枯涸之消渴陰虛陽越之喘嗽並著奇效仲聖治少陰咽痛用豬膚亦取其補陰虛而戢浮陽也後賢不察反指爲有毒之物汪訒庵非之是矣惟外感初愈及虛寒滑瀉溼盛生痰之證槪不可食以其滋膩更甚於阿膠熟地龍眼也然豬以浙產者爲良北豬不堪用吾杭燥肉鮓即豬皮爲之可以致遠入藥尤爲餰當不必泥於皮與膚之字面而

穿鑿以誇考據也

秋初家慈猝仆於地急延孟英診之脈浮絃以滑用羚羊角膽星牡蠣石菖蒲丹參茯苓鈎藤桑葉貝母橘紅蒺藜等以順氣蠲痰息風降火而痊癸卯春前數日忽作欠伸而厥孟英切脈微弱而絃曰病雖與前相似而證則異矣以高麗參白朮何首烏山茱萸枸杞桑椹石斛牛膝蒺藜橘紅牡蠣等鎮補攝納以瘳予謂此等證安危在呼吸之間觀前後卒仆數案可見其辨證之神雖古人不多讓況世俗之所謂醫乎家慈兩次類中予皆遠出微孟英吾將焉活感銘五內聊識數言惟願讀是書者

體其濟世之心臨證得能如是將胥天下之沉疴而盡起矣

張養之弱冠失怙後卽遘无妄之疾纏綿七載罄其貲財經百十三醫之手而病莫能愈因廣購岐黃家言靜心參考居然自療而痊然鼻已壞矣抱此不白之冤自慙形穢乃閉戶學書專工作楷其志良可悼也孟英因與之交見其體怯面青易招外感夏月亦著複衣頻吐白沫詢知陽痿多年常服溫辛之藥孟英屢諫之而已亥九月間患惡寒頭痛自餌溫散不效逆孟英診之脈極沉重按至骨則絃滑隱然臥曲房密幃之中爐火重裘尚覺不足以禦寒且涎沫仍吐毫不作渴胸腹無脹悶之苦

咳嗽無暫輟之時惟大解堅燥小溲不多口氣極重耳乃謂曰此積熱深錮氣機鬱而不達非大苦寒以瀉之不可也養之初猶疑焉及見方案辨論滔滔乃大呼曰弟之死生係乎一家之命唯君憐而救之孟英慰之曰我不惑外顯之假象而直斷爲實熱之內蘊者非揣度之見而確有脉證可憑但請放心靜養不必稍存疑畏及二三帖後病不略減諸友戚皆詆藥偏於峻究宜慎重服之有于某者揚言於其族黨曰養之之命必送於孟英之手矣衆楚交咻舉家惶惑次日另延陳啓東暨俞某並診孟英聞之急詣病榻前謂曰兄非我之知己也則任兄服誰

之藥。我不敢與聞也。兄苟裕如也。則任兄廣徵明哲。我不敢阻撓也。今兄貧士也。與我至交也。拮据貧窶。延來妙手。果能洞識病情。投劑必效。則我亦當竭力慫恿也。第恐雖識是病而用藥斷不能如我之力專。而劑大也。苟未能確識是證。而以無毀無譽之方。應酬塞責。則因循養患。誰任其咎也。或竟不識是病而開口言虛。動手即補。甘言悅耳。兄必信之。我不能坐觀成敗。如秦人視越人之肥瘠也。今俞某之方。如是。陳醫殊可。卻之速者。人趕去。辭絕。留此一款以作藥資。不無小補。況連服苦寒病無增減。是藥已對證。不比平淡之劑。誤投數帖。倘不見害也。實由

熱伏深錮藥未及病今日再重用硝黃犀角冀頑邪藴毒得以通泄下行則周身之氣機自然流布矣養之伏枕恭聽大爲感悟如法服之越二日大便下如膠漆穢惡之氣達於戶外而畏寒即以遞減糜粥日以加增旬日後糞色始正百日後康健勝常嗣後雖嚴冬亦不甚畏冷偶有小恙輒服清潤之方腸道復與近添一女養之嘗頌於人曰孟英之手眼或可得而學也孟英之心地不可得而及也我之病奇病也孟英雖具明眼而無此種熱情勢必築室道旁亂嘗藥餌不能有今日矣況不但有今日而十餘年深藏久伏之痾一旦掃除自覺精神勝昔可爲

此是熱痰伏於肺絡故用藥如此

後日之根基再生之德不亦大哉

孫午泉進士患哮痰多氣逆不能著枕服溫散滋納藥皆不效孟英與北沙參桂枝茯苓貝母花粉杏仁冬瓜仁絲瓜絡枇杷葉旋覆海石蛤殼等藥覆杯卽臥數日而痊

石符生隨乃翁自蜀來浙同時患瘧醫者以小柴胡湯加薑桂投之不效改用四獸休瘧等法反致惡寒日甚穀食不進惟飲燒酒薑湯圍火擁前重裘厚覆胸腹痞悶喜以熱熨猶覺冷氣上衝頻吐粘稠痰沫延至臘初疲憊不堪始憶及丙申之恙請孟英過診脈沉而滑數苔色黃膩不渴便溏溺赤曰是途次所

受之暑溼失於清解復以溫補之品從而附益之釀成痰飲盤踞三焦氣機爲之阻塞所以喜得熱熨熱飲氣衝反覺如冰若不推測其所以然之故而但知聞問在切脈之先一聽氣冷喜熱無不以爲眞贓現獲孰知病機善幻理必合參以脈形象證（審病要法）竝究則其爲眞熱假寒自昭昭若揭矣與大劑苦寒之藥而以蘆菔湯煎漸服漸不畏寒痰漸少穀漸增繼用甘涼善後喬梓皆得安痊

王氏醫案卷一終

# 王氏醫案卷二 原名回春錄

杭州王士雄孟英著

同郡周　鑅光遠輯錄

庚子春、戴氏婦產後惡露不多。用山查益母草酒煎。連服數日。遂發熱自汗口渴不饑眩暈欲脫徹夜不眠孟英視之曰此禀屬陰虧。血已隨胎而去。雖惡露甚少。但無脹痛之苦者不可妄投藥餌。酒煎益母山查不特傷陰。且能散氣而汗泄口乾津液有立竭之勢。即仲聖所謂無陽也蓋人身天真之氣謂之陽陽根於津陰化於液。津液既奪。則陽氣無根而眩暈。陰血不生而

無痳若補氣養陰則舍本求末氣血不能生津液也惟有澄源潔流便津液充而氣血自復庶可無憂以西洋參生黃耆龍骨牡蠣萎蕤百合甘草麥冬生薏苡生扁豆石斛木瓜桑葉蔗漿投之一劑即安數日而愈後以滋塡陰分服之乃健

王某久患吐血體極孱弱沈琴癡囑其丐孟英治之服藥甫有小愈而酷暑之時陡患霍亂轉筋大汗如雨一息如絲孟英視曰陰血久奪暑熱鴟張吾霍亂論中之缺典也姑變法救之用北沙參枇杷葉龍牡木瓜扁豆苡仁滑石桑葉蠶砂石斛豆卷投之良愈調理每日仍服滋補以治宿恙越二載聞服溫補藥

致血暴涌而亡。

赤山埠李氏女。素禀怯弱。春間汛事不行。脇腹聚氣如瘕。減餐肌削。屢服温通之藥。至孟秋加以微寒壯熱。醫仍作經閉治。勢瀕於危。乃母託伊表兄林豫堂措辦後事。豫堂特請孟英一診以決之。孟英切其脈時。壯熱烙指。汗出如雨。其汗珠落於脈枕上。微有粉紅色。乃曰。虛損是其本也。今暑熱熾盛。先當治其客邪。庶可希冀。疏白虎湯加西洋參元參竹葉荷梗桑葉。及何醫至。一籌莫展。聞孟英主白虎湯。乃謂其母曰。危險至此。尚可服石膏乎。且本草於石膏條下。致戒云。血虛胃弱者禁用。豈彼未

之知也豫堂毅然曰我主藥與其束手待斃盍從孟英死裏求生之路耶遂服二帖熱果退汗漸收改用甘凉清餘熱日以向安繼與調氣養營陰宿瘕亦消培補至仲冬汛至而痊次年適孫夔伯之弟

張氏婦患氣機不舒似喘非喘似逆非逆似太息非太息似虛促非虛促似短非短似悶非悶面赤眩暈不饑不臥補虛清火行氣消痰服之不應孟英診之曰小恙耳旬日可安但須懲忿是囑與黃連黃芩梔子楝實鼈甲羚羊角旋覆赭石海蛇地栗爲大劑送當歸龍薈丸未及十日汛至其色如墨其病已若失

後與養血和肝。調理而康。

牙行王炳華室。夏患臂痛。孫某曰風也。服參耆歸芍數帖。臂稍愈而脘痛。孫曰寒也。加以附桂。痛不止而漸覺痰多。孫曰肝腎不足也。重用熟地枸杞。令其多服取效。不料愈服愈劇。漸至昏厥。孫尚以爲藥力之未到。病體之久虛。前方復爲加重。甚而時時發厥。始請孟英診之。脈沈而有弦滑且數之象。乃謂炳華曰。此由過投溫補。引動肝風。煽其津液爲痰。痰復乘風而上。此暈厥之由來也。餘波則奔流經絡。四肢因而抽搐。陽氣盡逆於上。宜乎鼻塞面浮。濁氣不能下達。是以便滯不饑。炳華曰神見也。

溫補藥服幾三月矣不知尙可救乎孟英曰勿疑吾藥猶有望焉遂與大劑甘寒息風化飲佐以凉苦泄熱淸肝厥果漸止各恙遞蠲兩月後康復如常予偶於舊書中檢得無名氏鈔本一冊所錄多岐黃之言內一條云附桂回陽在一二帖之閒萬一誤投害亦立至功過不掩其性之毒烈也槪可見矣奈世人不知藥爲治病而設徒以貪生畏死之念橫於胸中遂不暇顧及體之有病無病病之在表在裏但聞溫補之藥無不欣然樂從者摸稜之輩趨兢存心知其死於溫補而無怨悔也乃衣鉢相傳不必察其體病脈證之千頭萬緖僅以溫補之品二十餘味

相迭為用卽成一媚世之方且託足金匱之門摹擬腎氣之變蓋知熟地之陰柔可縛附桂之剛猛誤投不致卽敗偶中又可邀功包藏禍心文姦飾詐何異新莽比周公子雲學孔聖哉人以其貌古人而口聖賢也多深信而不疑迨積薪既厚突火頓燃雖來爛額焦頭之客其不至於焚身者幸矣較彼孟浪之徒誤投純陽藥致人頃刻流血而死者其罪當加十等誅心之論救世之言知我罪我不遑計焉孟英見之拜讀千過且曰勸漢學以欺世由來久矣徐靈胎之論無此透徹可與退之原道文竝峙當考其姓字於仲景先師廟內建護聖祠以祀之予謂孟

英如此稱許則其可傳也奚疑故附刊此案之後以證王氏婦温補藥服及三月卽所謂陰柔束縛剛猛之故致人受其愚而不覺者後之人可以鑑矣

莊芊霞芝階中翰之三郎也闈後患感日作寒熱七八次神氣昏迷微斑隱隱醫者無策始迎孟英視之曰此平昔飲酒積熱深蘊挾感而發理從淸解必誤投温補以致熱勢披猖若是詢之果三場皆服參且攜棗子浸燒酒入闈初病尚不至此因連服羌防薑桂漸以滋甚孟英曰是矣先以白虎湯三劑斑化而寒熱漸已繼用大苦寒之藥瀉其結熱所下黑矢皆作棗子氣

宗曰病虛熱在胃也補虛則礙熱清熱則妨虛茲又加以食積尤爲棘手須看其用藥圓到處

旬日後與甘潤滋濡之法兩月始得全愈

金愿谷舍人次郎魁官九月間患五色痢日下數十行七八日來口噤不納腹痛呻吟危在旦夕矣有主人參以補之者有主生軍以蕩之者舉家皇皇不知所措孟英視之曰暑挾食耳誤服熱藥矣攻補皆不可施也輕清取之可卽愈焉以北沙參黃連鮮蓮子梔子黃芩枇杷葉石斛扁豆銀花桔梗山查神麴滑石爲方其家以爲病深藥淡恐不濟事西席莊曉村云縱使藥不勝病而議論極是定不致加病也竭力贊其居停投之覆杯卽安旬日而起予聞孟英嘗曰蓮子最補胃氣而鎮虛逆若反

胃由於胃虛而氣衝不納者但日以乾蓮子細嚼而嚥之勝於他藥多矣凡胃氣薄弱者常服玉芝丸能令人肥健至痢證噤口皆是熱邪傷其胃中清和之氣故以黃連苦泄其邪即仗蓮子甘鎮其胃今肆中石蓮皆僞味苦反能傷胃切不可用惟鮮蓮子煎之淸香不渾鎮胃之功獨勝如無鮮蓮則乾蓮亦可用或產蓮之地湖池中淘得入水不腐之老蓮即古所謂眞石蓮也昔人治噤口痢多用此然可不必拘泥嫌免作僞之人以贋亂眞反致用而無效徒使病不即愈也

附　玉芝丸　孟英

晡熱夜熱原有肺熱血瘀二候斷非滋陰所能愈況溫病之後咳嗽夜熱顯爲遺邪在肺滋陰藥愈沒干涉矣

豬腈一具治淨以蓮子去心入腈內水煎糜爛收乾搗爲丸服

陳足甫稟質素弱上年曾經吐血今夏患感之後咳嗽夜熱飲食漸減醫作損治滋陰潛陽久服不效秋杪孟英診之曰陰分誠虛第感後餘熱逗留於肺阻氣機之肅降搏津液以爲痰此關不淸雖與滋塡培補之藥亦焉能飛渡而行其事耶先淸肺氣以保胃津俾治節行而灌漑輸然後以甘潤濃厚之法補眞陰始克有濟乃尊仰山聞之擊節歎服如法施之果漸康復

胡蔚堂舅氏年近古稀患囊腫小溲赤短寒熱如瘧孟英曰非

外感也。乃久蘊之溼熱下流。氣機尚未宣泄。與五苓合滋腎加楝實梔子木通兩劑後。囊間出腥粘黃水甚多。小溲漸行。寒熱亦去。繼與知蘖八味去山藥萸肉。加梔子楝實芍藥苡仁等。久服而愈。壬寅夏感受暑溼。誤投溫散。以致譫語神昏。勢瀕於危。而肛前囊後之間潰出腥膿。瘡口深大。瘍科以爲懸癰也。數治罔效。時孟英患痁未痊。予固邀其扶病一診。孟英曰。懸癰乃損怯證。成之以漸。今病來迅速。腥穢異常。是身中久蘊厚味溼熱之毒。挾外受之暑邪。無所宣泄。下注而爲此證。切勿敷藥以遏其外走之勢。但舌強而紫赤。脈細而滑數。客邪熾盛。伏熱蘊隆

藥大劑可法

陰分甚虧深虞津涸先與清營之劑三投而神氣漸清次以凉潤陽明便暢而熱蠲臘淨改用甘柔滋養月餘潰處肌平脊後參入參耆竟得康强如昔

汪吉哉久瘧不愈醫謂元氣已虛雜投溫補漸至肌瘦內燔口乾咳嗽寢汗溺赤飲食不甘孟英視之曰餘邪逗留血分也與秦艽鼈甲散而瘳其堂兄養餘亦患瘧數月多醫療之罔效肌瘦自汗腰膝痠輭不能稍坐極其畏冷孟英曰此大虛證胡反不補猶以消導是何居心與參耆朮草熟地白芍五味杜仲山藥龍骨牡蠣桂枝大棗木瓜服數十帖而起

眼前道理而人多不悟一經拈出便成名論此與以針治虛損者同一悖謬

孟英治其令叔高年痰嗽喘逆礙臥肢冷顴紅飲食不進與眞武湯而安

脈〇證〇[illegible]〇例〇治法

湖墅張春橋素禀不堅頭眩腦鳴頻服溫補藥甚覺畏冷人皆謂其體偏於寒也辛丑春始請孟英診之脈甚數曰陰虧也溫補非宜改服滋水培元之劑頗爲有效夏間或勸以灸火云可以除百病蓋未知灼艾之可以除百病者謂可除寒溼凝滯陽氣不能宣通之證非謂內傷外感一切之病皆可灸以除之也故仲景有微數之脈愼不可灸之訓正以艾火大能傷陰也灸後數日即寒少熱多宛如瘧疾醫者以爲脾寒病投以溫散日

以滋甚。春橋知藥治未符。堅不肯服。乃父與之詢其故。漫曰要兒服藥須延王先生診視。與之遂邀孟英治之。切其脈滑數倍加。曰陰虛之體。內熱自生。灸之以艾。火氣內攻。時當溽暑。天熱外爍。三者相交。陰何以堪。再投溫散。如火益熱。當從痺瘧治。專以甘涼息熱。則陰津不致枯涸。而寒熱不攻自去。所謂治病必求其本也。竟不用一分表散藥而治愈。

樓流所司藥陳芝田。於仲夏患感。諸醫投以溫散。延至旬日。神昏譫妄。肢搐耳聾。舌黑脣焦。囊縮溺滴。胸口隱隱微斑。一望而知其危矣。轉邀孟英診之。脈細數而促。曰陰虧熱熾。液將涸矣。

一派甘寒之藥飫可滌熱又以生津眞治溫良法也惟溼溫證實稍加斟酌耳

遂用西洋參元參生地二冬知蘗楝實石斛白芍甘草稍銀花木通犀角石菖蒲大劑投之次日復診其家人云七八日來小溲不過涓滴昨藥服六七个時辰後解得小溲半杯孟英曰此即轉機也然陰氣枯竭甘涼濡潤不厭其多於前方再加龜板鼈甲百合花粉大鍋煎之頻灌勿歇如是者八日神氣始淸諸恙悉退純用滋陰之藥調治匝月而瘳予謂孟英學識過人熟腸獨具凡遇危險之候從不輕棄最肯出心任怨以圖之如此案八日後神氣始淸若經別手縱使治法不錯而一二帖後不甚起色必規避堅辭致病家惑亂謀及道旁雖不死於病亦必

孟英能用大劑故能起不治之證亦古人所未有也

死於藥矣。此在醫者之識老心堅。又須病家之善於擇而任之專也。談何易耶。且聞孟英嘗云。溫熱液涸神昏。有投犀角地黃等藥至十餘劑。始得神清液復者。因溫熱案最夥。不暇詳錄。姑識此以告司人之命者。

江小香病勢危篤。浼人迎孟英診之。脈虛絃而小數。頭痛偏於左。後子夜熱躁。肢冷欲嘔。口乾不欲飲。不饑不欲食。舌蹇言澁。溺黃而頻。曰體屬素虛。此由患感時過投溫散。陰津陽氣皆傷。如此二證方可議藥。後來進補而勢反日劇者。滋膩妨其中運。剛烈動其內風。以致醫者僉云。表之不應。補亦無功。竟成無藥可治之證。雖然。不過

從陰引陽從陽引陰絕妙機軸

難治耳未可遽棄也與秋石水拌制高麗參蓯蓉首烏生白芍牡蠣楝實鹽水炒橘紅桑葚石斛蒺藜茯苓煎呑飯丸肉桂心五分一劑躁平嘔止各恙皆減連投數服粥食漸安乃去首烏桂楝加砂仁末拌炒熟地菊花枸杞半月而瘳

溽暑之令痦疹盛行幼科僅知套藥升柴防葛亂施殆亦疫癘之病造化默行其殺運歟陳仰山家患此者十餘人其長郎耆芇孝廉之女勢最劇以痦甫出而汎至也醫者卻走始延孟英視之脈滑而數舌絳大渴面赤失音不食便瀉曰此由發散太過火盛風熾氣血兩燔氣分之邪由瀉而略泄其營分之熱

由汛而稍解其焚豈可畀其脫陷妄投止澀耶與西洋參石膏知母麥冬犀角生地連翹甘草石斛丹皮桑葉竹葉大劑投之三日而愈養陰善後遂以漸安其餘或輕或重孟英一以清解而痊

石誦羲夏杪患感多醫廣藥病勢日增延踰一月始請孟英診焉脈至右寸關滑數上溢左手絃數耳聾口苦熱甚於夜胸次迷悶頻吐粘沫啜飲咽喉阻塞便溏溺赤間有譫語曰此暑熱始終在肺竝不傳經一劑白虎湯可愈者何以久延至此也乃尋北涯出前所服方見示孟英一一閱之惟初診顧聽泉用清

解肺衞法爲不謬耳其餘溫散升提滋陰凉血各有來歷皆費心思原是好方惜未中病而北涯因其溏泄見孟英君石膏以爲治不敢與服次日復診自陳昨藥未投惟求另施妥法孟英曰我法最妥而君以爲未妥者爲石膏之性寒耳第藥以對病爲妥此病舍此法別無再妥之方若必以摸稜迎合爲妥恐賢郎之病不妥矣北涯聞而感悟頗有姑且服之之意而病者偶索方一看見首列石膏卽曰我胸中但覺一團冷氣湯水皆須熱呷此藥安可投乎堅不肯服然素仰孟英手眼越日仍延過診且告之故孟英曰吾於是證正欲發明夫邪在肺經清肅之

論亦根據喻氏而更加明透

令不行津液凝滯結成涎沫盤踞胸中升降之機亦窒大氣僅能旁趨而轉旋是一團涎沫之中爲氣機所不能流行之地其覺冷也不亦宜乎且予初診時即斷爲不傳經之候所以倘有今日而能自覺胸中之冷若傳入心包則舌黑神昏纔合吳古年之犀角地黃矣然雖不傳經延之踰月熱愈久而液愈涸藥愈亂而病愈深切勿以白虎爲不妥急急投之爲妙於是有敢服之心矣而又有人云曾目擊所親某石膏甫下嚥而命亦隨之況月餘之病耳聾泄瀉正氣已虧究宜愼用北涯聞之惶惑仍不敢投乃約翼日廣徵名士會商可否比孟英往診而羣賢

畢至且見北涯求神拜佛意亂心慌殊可憐憫欲與衆商榷恐轉生掣肘以誤其病遂不避謙讓援筆立案云病既久延藥無小效主人之方寸亂矣予三疏白虎而不用今仍赴招診視者欲求其病之愈也夫有是病則有是藥諸君不必各抒高見希原自用之愚古云鼻塞治心耳聾治肺肺移熱於大腸則爲腸澼是皆白虎之專司何必拘少陽而疑虛寒哉放膽服之勿再因循致貽伊戚也坐中顧聽泉見案即謂北涯曰孟英腸熱膽堅極堪倚賴如猶不信我輩別無善法也顧友梅許芷卿趙笛樓亦皆謂是疏方以白虎加西洋參貝母花粉黃芩紫菀杏仁

冬瓜仁枇杷葉竹葉竹茹竹黃而一劑甫投咽喉即利三服後各恙皆去糜粥漸安乃改甘潤生津調理而愈予謂此案不僅治法可傳其闡發病情處識見直超古人之上

劉廉方常州名士也在西湖受暑移榻於崔仲遷別駕處醫治垂危莊芝階舍人拉孟英往診之裸臥昏狂舌黑大渴溺赤便祕脈數而芤與犀角地黃湯加減服之神識已清略能進粥次日復診頗知問答大有生機仍處甘凉法以贈之并囑伊格外謹慎而越日莊半霞詣孟英偕往診視見其目張睛瞪齒露唇焦氣喘汗出揚手擲足而不可救藥矣眾楚交咻謂是寒凉藥

凝閉而然孟英曰病之宜涼宜熱汝輩不知也脈乃皮裏之事汝等不見也吾亦不屑爲之爭辨惟目瞪唇焦人所共覩則其死於何藥自有定論遂拂衣出半霞再三請罪孟英曰俗人之見何足介懷是非日後自明於我心無慊焉第斯人斯病皆可惜也既而始知有人主熱藥以僨事豈非命耶僅二載而仲遷病孟英聞之曰殆矣蓋知其陰虛而受暑溼恐主藥者未必能悔悟於前車也後果聞其廣服溫補之劑以致眞陰竭絕而死覆轍相尋迷而不醒可哀也已

甌鎭孫總戎令郎楚樓自鎭江來浙主於石北涯家途次卽患

寒熱如瘧脇痛痰嗽北涯見其面黧形瘦頗以爲憂卽延醫與診醫謂秋瘧與疏散方北涯猶疑其藥不勝病復邀孟英視之曰陰虧也勿從瘧治以葦莖湯加北沙參熟地桑葉丹皮海石旋覆貝母枇杷葉爲劑北涯見用熟地大爲駭然孟英曰君慮彼藥之不勝病吾恐此病之不勝藥贈此肅肺潤燥滋腎清肝之法病必自安楚樓聞之歎曰妙手也所論深合病情前在姑蘇服疏散藥甚不相安居停毋疑我服王公之藥矣果數日而瘥踰旬卽東渡赴甌去

姚雪蕉孝廉之太夫人年踰花甲患感兩月醫皆束手始延孟

英診之身已不能轉側水飲難於下嚥聲音不出便溺不通曰此熱邪逗留不去津液剝削殆盡計其受病之時正當酷暑豈即溫補是投但知其虛而不知其病耶閱前服諸方惟初手顧聽泉從吸受暑邪輕清開上立治爲合法耳餘方非不是起死回生之藥其如與病無涉何而況某小柴胡方服之最多蓋醫者執此和解之法謂不犯汗吐下三者之險豈不穩當病家見其參胡並用謂補正祛邪具一舉兩全之美最爲上策孰知和解足少陽傳經傷寒之劑不可以概和各經各氣之各病徒使參胡提升熱邪以上逆致一身之治節無以清肅下行而薑棗

溫膩涇濁於中焦致運化之樞機失其灌溉之布氣機愈窒津液愈乾和解之湯愈進而氣愈不和病愈不解今則雖有良治而咽喉僅容點滴氣結津枯至於此極英雄無用武之地矣霅蕉昆季力懇挽救乃疏甘涼濡潤之方囑其不限時刻不計多寡頻以水匙挑入使其漸滲下喉而一日之間僅灌一小杯許其病勢之危於此可想直灌至旬餘氣機始漸流行藥可服小半劑矣人見轉機之難不無議論旁生賴孟英靜鎮不搖乃得日以向愈粥食遞加惟大解久不行或以爲憂孟英曰無恐也水到渠成穀食安而津液充則自解矣若欲速妄攻則久不納

穀之胃尙有何物以供其蕩滌哉至九月下旬始有欲解之勢孟英連與補氣益血之藥尙不能下於前方加蜣螂一對熱服即解凡不更衣者計及五十日矣聞者莫不驚異繼以平補善後而痊

仲冬大雪連朝積厚丈許嚴寒久凍西湖可行車馬斯時也盛少雲患痰嗽夜熱自汗不寐左脇痛如鍼刺肌削不饑自問不起矣請孟英託以後事及診其脈許以可生蓋病來雖惡未經誤藥也與固本加龜板鼈甲茯苓知母青黛石斛花粉白芍楝實海石旋覆貝母蛤殼牛膝出入為大劑投之即效連服四五

十帖而痊。予謂斯證患於斯時。若經別手。未有不投溫補者。而少雲能與孟英遊。其亦具眼之人乎。此眞所謂患難交。不可不留心於平日也。然亦不能人人而遇之。殆佛氏所謂有緣存乎其間歟。

壬寅春。邵小墀室患汛愆。釋醫診以爲妊。廣服保胎藥。漸至腹脹跗腫。氣逆礙臥。飲食不進。入夏延孟英視之。曰。血虛氣滯誤補成脹也。（先脈其滑以指脈亦一定之法）先以黃連厚樸山查雞內金橘皮大腹皮枳實茯苓梔子楝實杏仁紫菀旋覆等藥。少佐參朮服之。氣機漸運。脹去食安。漸入滋陰養血之治。數月經行而愈。

扶脾抑肝製方靈動

凡心腎不交之人多不能仰臥以仰則腎氣不能上承而心氣愈浮也

一人患晨泄有年累治不效而春間尤甚孟英按其脈曰汝雖苦瀉而瀉後腹中反覺舒暢乎曰誠然苟不泄瀉又脹悶減食矣而服四神附桂之藥其瀉必加此曷故也曰此非溫升補澀之證乃肝強脾弱木土相凌處一方令其常服數帖即安後竟無此恙矣方用白朮苡仁黃連楝實桂枝茯苓木瓜芍藥蒺藜橘皮而已

邵魚竹給諫起居食飲如常惟僅能側臥略難仰睡仰而寐無恙也稍一合眼則驚竄而醒雖再側眠亦徹夜不得寐矣多年莫能治孟英以三才合枕中丹加黃連肉桂服之良效其長郎

心腎交通而以黃連肉桂媾合之用意甚巧

子旅久患痰多胸膈滿悶連年發癇藥之罔效孟英脈之曰氣分偏虛痰飲阻其清陽之旋運宜法天之健以爲方則大氣自還而流行不息胸次乃廓然如太空矣與六君去甘草加黃耆桂枝薤白蔞仁石菖蒲蒺藜旋覆服之滿悶漸舒癇亦不發矣

予荆人娩後惡露不行或勸服生化湯適孟英枉顧診曰陰虛内熱天令炎蒸雖赤沙糖不可服也以生地丹參丹皮豆卷茺蔚子茯苓桃仁山查卮子澤蘭琥珀投之即效且無別恙而易健可見體質不齊藥難概用況其致病之因不一病機傳變無窮語云量體裁衣而治病者可不辨證而施治耶孟英常曰凡

不寒不燥眞陰虛血涸者之良劑

通人之論無論寒涼熱藥用不得當皆足誤人不可不知

產後世俗多尙生化湯。是以一定之死方。療萬人之活病。體寒者固爲妙法。若血熱之人。或兼感溫熱之氣者。而一概投之。驟則變證蜂起。緩則蓐損漸成。人但知產後之常有。而不知半由生化湯之厲階。此風最盛於越。方本傳於越之錢氏。自景岳采入八陣。遂致流播四海。人之陰受其害者。數百年矣。從無一人能議其非。今特爲此長夜之燈。冀後人不致永遠冥行。或可稍補於世。但景岳最偏於溫補。而獨於產後一門。力辨丹溪大補氣血爲主之非。可謂此老之一隙微明。惜猶泥於產後宜溫之謬說。蓋由未入仲聖之宮牆也。

戚嫗者年六十餘矣自幼傭食於黃蓮泉家忠勤敏幹老而彌甚主僕之誼勝於親戚也秋間患霍亂轉筋孟英視之暑也投自製蠶矢湯兩服而安三日後忽然倦臥不能反側氣少不能語言不飲不食蓮泉惶懼不暇遠致孟英即邀濟仁堂朱某診之以為霍亂皆屬於寒且昏沈欲脫疏附子理中湯與焉蓮泉知藥猛烈不敢遽投商之王安伯安伯云以予度之且勿服也若謂寒證則前日之藥下嚥即斃吐瀉安能漸止乎蓮泉聞之大悟着人飛趕孟英至而切其脈曰此高年之體元氣隨瀉而泄固當補者第餘暑未清熱藥在所禁耳若在孟浪之家必以

前之凉藥爲未當今日温補爲極是縱下咽不及救亦惟歸罪於前手寒凉之誤也設初起卽誤死於温補而世人亦但知霍亂轉筋是危險之證從無一人能知此證有陰陽之異治法有寒熱之殊而一正其得失者此病之所以不易治而醫之所以不可爲也今君見蘊附而生疑安伯察病機之已轉好問者心虛識機者智贍二美相濟遂使病者跳出鬼門關醫者卸脫無妄罪幸矣幸矣乃以高麗參麥冬知母萎蕤木瓜扁豆石斛白芍苡仁茯苓蒺藜爲方服六劑始能言動漸進飲食調理月餘而健

可見浙人稟賦之薄若幽冀之人卽誤服青麟丸數錢亦不至如斯之甚也

七月十八日夜子患霍亂轉筋甚劇倉卒間誤服青麟丸錢許比曉急邀孟英診之脈微弱如無耳聾目陷汗出肢冷音啞肌削危象畢呈藥恐遲滯因囑家慈先濃煎高麗參湯亟爲接續隨以參朮白芍茯苓附桂乾薑木瓜苡仁扁豆蓮實爲方一劑而各證皆減次日復診孟英曰氣分偏虛那堪吐瀉之泄奪誤飲苦寒微陽欲絕昨與眞武理中合法脾腎之陽復辟矣剛猛之品可以撤去蓋吐瀉甚而津液傷筋失其養則爲之轉薛生白比之痙病例可推也凡治轉筋最要顧其津液若陽旣回而（此二段醫論極精微凡用寒用熱俱宜具此權衡方無過當之弊否則寒）再投剛烈則津液不能復而內風動矣此治寒霍亂之用附桂

亦貴有權衡而不可漫無節制致墮前功也即於前方裁去薑雖中病而服之不止反受其害矣喻氏論中寒證亦具此意附肉桂加黃耆石斛服至旬日而愈予謂此番之病危同朝露若非孟英恐不能救常聞張柳吟云但使病者聽孟英論病之無微不入用藥之無處不到源源本本信筆成章已覺疾瘳過半古云檄愈頭風良有以也

陳藝圃亦知醫其室人於仲秋患霍亂轉筋自診以爲寒也投熱劑勢益甚延朱茂才覗之亦同乎主人之見也病尤劇始請孟英決之曰寒爲外束之新邪熱是內伏之眞病口苦而渴薑附不可投矣與河間法人皆不之信也再與他醫商之仍投熱

此必別有外證可憑故直斷爲暑與痰溼未有專視脈之芤與歇至而如是定斷者讀者勿被瞞過

藥乃至口鼻出血而死極其悔歎始服孟英之卓見子謂霍亂一證近來時有而醫皆不甚識得清楚死於誤治者極多孟英特著專論雖急就成章而辨晰簡當略無支漏實今日醫家首要之書以其切於時用不可不亟爲熟讀而研究也

顧雲垞體豐年邁患瘧於秋脈芤而稍有歇止孟英曰芤者暑也歇止者痰溼阻氣機之流行也（卓識）大忌溫補以助邪氣及與清解蠲痰之法病不少減而大便帶血（邪將去矣）孟英曰暑溼無形之氣而平素多痰邪反得以盤踞頗似有形之病清解不克勝其任氣血皆受其滋擾必攻去其痰使邪無依附而病自去切勿以高

此方可謂峻極良由識高非徒膽大

用補亦要用得其宜方能奏效非一味蠻補即能愈疾也案中諸治可以為法

年而畏峻藥伊姪桂生少府亦精於醫者也聞之極口稱是遂以桃仁承氣湯加西洋參滑石芩連橘紅貝母石斛為方送礞石滾痰丸乃郎石甫孝廉云此藥在他人必畏而不敢服我昔年曾患暑溼證深悉溫補之不可輕試況高明所見相同更何疑乎徑服二劑下粘痰汙血甚多瘧即不作仍以清潤法善後而康

郘子受令壼患吐血肌膚枯澀口渴脈虛大孟英曰氣分之陰虧也溫補既非滋填亦謬以參耆二冬知母百合葳蕤石斛桑葉枇杷葉投之而愈

九月間張春橋患瘧寒少熱多間二日而作甫兩發形即清瘦孟英診曰脈絃而細尺中甚數疾作於子夜口乾嗜飲乃足少陰熱瘧也兩發遽爾形消胡可玩視吾以妙藥奉贈可期即已但請即服不可商於人而致生疑議也方用元參生地知母丹皮地骨皮天冬龜板茯苓石斛桑葉春橋以向所心折遂服之一劑瘧即止再以滋陰善後而愈予謂此證一帖而瘳似乎輕易但非眞才實學焉有此種妙治設遇別手非溫補即提表其禍可勝道哉然天下之病無論輕重總貴初治得法何致輕者重而重者危耶奈世俗之情必使輕者重而後轉安始知醫藥

之功殊可歎也按此證世人但知其爲三陰瘧籠統治以溫補之法從未聞有分經用藥者今提出少陰二字創立清凉之劑用藥精當取效敏捷法似新奇理自完足所謂活人治活病全以活潑運之也可以啟人慧悟垂作典型

金寬甫初冬患感局醫黃某聞其向來不拘何病總須溫藥而痊胸懷成見進以薑桂之方漸至足冷面赤譫語煩躁疑爲戴陽而束手矣舉家徬徨延孟英診焉曰此伏邪晚發誤與升提熱浮於上清解可安寬甫猶以向不服涼藥爲疑方中芩連之類堅不肯用乃兄愿谷中翰極力開導督人煎而飲之果得霍

然。

周曉滄乃郎品方患冬溫。所親顧聽泉知其體屬陰虧。病非風寒也。不犯一分溫升之品。而證不能減。勢頗可危。乃虛懷轉邀孟英診之。曰所治良是也。但於方中加貝母杏仁紫菀冬瓜子等味與之。遂效。可見藥貴對病。雖平淡之品。亦有奇功。孟英嘗云。重病有輕取之法。於此可見。

癸卯春。邵秋子令堂年近六旬。患寒熱如瘧者久矣。諸醫雜治罔效。孟英視之。曰此溼邪久蘊。已從熱化。誤投提補。動其肝陽。痰飲因而上逆。與通降之法。寒熱即減。而包某謂瘧久陰虛理

宜滋養病家聞之近是遂進首烏鼈甲等藥漸至脈伏胸痞呃忒自汗渴飲不食顴赤便泄包某束手疏生脈散以塞責舉家徬徨再求孟英診之曰此滋膩阻塞氣機清陽不司旋運痰飲閉滯隧絡非脫象也補藥不可進（喜用熟地耆鼈之）以栝蔞薤白合小陷胸加菖蒲竹茹旋覆貝母杏仁紫菀枇杷葉投之（清熱滌飲開氣機以散滯膠之失）呃止脈出大有轉機而鄭某謂病固屬痰須溫熱以宣通勿寒涼而凝遏病家又惑焉薑桂頻投既而脣腫咽疼不能進飲舌乾短硬難出語言復請孟英救療與犀角地黃湯加元參知母銀花竹黃花粉膽星（甘寒生津以救燎烈之失）石菖蒲竹瀝之類六七劑吐出極臭膠痰甚多粥飲漸進此第

痘原感疫而發醫林改錯中言之甚詳

三次生機也奈狂瀾莫障邪說橫行輒以涼藥不宜擅服久病必定元虛甘言悅耳遂至升散溫補各逞所能符咒乩方罔不徧試延至仲夏腭腐齦爛脣高數寸竟成燎原莫救仍懇孟英設法乃堅辭不能措手付局醫黃某敷治腫爛日甚而終

上年秋燥冬暖略無霜雪河井竝涸吾杭自九月間起天花流行十不救五小兒之殤於是者日以百計孟英曰此痘疫也治法當與常痘有異惜幼科未之察耳且天令發泄不主閉藏入春恐多喉患特刊加味三豆飲方俾未曾佈痘者預服免患將出者恣飲冀輕又勸人頻服青龍白虎湯以杜春來喉恙不料

其言果應。三春不雨。喉痧甚多。醫者猶不悟其致病之因。僅知發散。正如火上添油。孟英胸有成竹。一以仲聖白虎湯爲救焚主劑。若已及於營分者。用晉三犀角地黃湯相機加減。又刊青龍白虎湯。暨錫類散方。廣爲印送。賴此以活者。不可勝數。

附 加味三豆飲

生綠豆　生黃豆　生黑大豆或用生白扁豆亦可

生甘草　金銀花　水煎服

孟英原刻自注云。古方三豆飲。爲痘證始終可服之妙藥。未出時常服。痘可使稀。將出時急服。重可冀輕。已出

時恣服。逆可轉順。盡出時頻服。毒可易清。俗傳種痘是密室烘花。更有初生小兒於十八日內服藥。令其出痘之法。是揠苗助長。此等矯揉造作。陰受其害者。古今來不知幾恒河沙數矣。至於種種稀痘之方。皆無義意。或以毒藥損人元氣。或以穢物致生別恙。愼勿爲其所惑。惟此方藥極簡易。性最平和。味不惡劣。易辦易服。不必論其體質。久服無弊。誠盡善盡美之王道藥也。杭人惑於患痘不食豆之說。甚屬可鄙。今特辨明。冀人醒悟。凡小兒能啜飲後。卽以此藥日日代茶。誠保赤之首章焉。

原方用赤豆性燥傷陰予以黑大豆易之更有補陰之績雖燥令燥體皆無礙矣再益銀花甘草而化毒之功尤勝或疑銀花性凉似難久用不知三豆皆穀也性能實脾得銀花以濟之更覺冲和况小兒體稟純陽極宜此甘凉補陰之味豈特稀痘尤能明目消疳不生瘡癤泄瀉等病其功未能殫述也

附 青龍白虎湯

橄欖 生蘆菔 水煎服

孟英自注云此予自制方也橄欖色青清足厥陰內寄

之火風而靖其上騰之燄蘆菔色白化手太陰外來之燥熱而肅其下行之氣合而爲劑消經絡留滯之痰解膏粱魚麪之毒用以代茶則龍馴虎伏藏府清和豈但喉病之可免耶且二味處處皆有人人可服物異功優久任無弊實能弭未形之患勿以平淡而忽諸

附 錫類散

象牙屑焙 眞珠各三分 飛淨青黛六分
梅花冰片三釐 壁錢二十個俗名喜兒窠木板上者勿用
西牛黃 人指甲各五釐男病用女女病用男合送濟人須分別配之

共研極細粉吹患處流出惡涎卽愈○孟英自注云此專治爛喉痧疹之神方也尤鶴年附載於金匱翼云張瑞符傳此方以救人而得子故子名之曰錫類散

一

段春木之室爛喉內外科治之束手姚雪蕉孝廉薦孟英視之骨瘦如柴肌熱如烙韌痰阻於咽喉不能咯吐須以紙帛攪而曳之患處紅腫白腐齦舌皆糜米飲不沾汛事非期而至按其脈左細數右弦滑曰此陰虧之體伏火之病失於清降擾及於營先以犀角地黃湯清營分而調妄行之血續與白虎湯加西洋參等肅氣道而瀉燎原之火外用錫類散埽痰腐而消惡毒

種痘之法以人巧而奪天工原爲妙法但須愼於擇時若投氣流行之時感其氣者尙有險隘爛喉之際況又加以痘毒耶此乃醫之不明未可甚歸咎於種痘也

繼投甘潤藥調餘熱而充津液日以向安月餘而起

吳雨峯明府家囑兒科爲其仲郎所出之兩孫種痘下苗二三日發熱咽疼醫以爲痘之將形也投以升透之藥赤斑似錦喉爛如焚半月之間闔家傳染諸醫莫敢入其室孟英往診時見其三郎耕有四郎小峯尙未病亟曰已病者固當圖治未病者尤宜防患傳以靑龍白虎湯代茶恣飮竟得無恙其令閫洪宜人及仲媳皆爲之治愈此外如其長媳其令嫂其三孫其僕其探病之女戚殞於是病者七人焉時雨峯粲巖兩喬梓咸宦於外仲郎亦幕遊江右不料因種痘而釀此家禍益信孟英勸人

（痘疹一門以護喉爲第一要義一見喉痛急清降大忌升提何專科而不知此耶）

勿種痘之說爲可訓矣

潘洪疇託兒醫爲其仲郎春波所出之孫種痘下苗三日即咽喉痛而後升之即赤種出之痘亦必不潰痛醫與升散藥發熱斑爛七朝而夭春波及其弟祥衍皆染其病春波之證顧聽泉治而愈矣祥衍之恙咽喉爛至於舌胸膈痞塞不通牙關緊濇小溲淋痛口流紫黑血塊人皆謂其臟腑爛焉孟英視之曰惡血毒涎正欲其出吹以錫類散用椀承其口流出涎血甚多咽喉牙環胸膈皆得漸舒投以犀角地黃湯加元參銀花童溺藕汁竹黃花粉貝母石菖蒲之類漸以向安繼與生津填補而痊

夏間顧聽泉邀孟英視其所親屠緣堂之恙孟英曰陰生可慮果於夏至前五日而卒屠之五令郎患痰嗽者數年近因悲哀病作徐某見其嗽甚則吐也投以參朮之劑病益甚閏七月十七夜緣堂忽示夢云汝病須延孟英診視服溫養藥可愈覺而異之即逆過診孟英曰此陰虛勞嗽嗽久而衝氣不納則嘔吐非胃寒也經言勞者溫之亦溫養之謂非可以溫補施之者病者見案更爲驚歎始以父夢告焉孟英亦爲之肅然方用西洋參熟地茯苓二冬茯苓坎版牡蠣紫石英萎蕤枇杷葉橘皮服之果安子謂凡事皆可以感天地格神鬼況醫爲性命之學耶

滋陰降氣加以鎮攝乃虛嗽良法非兼外感者所可用

即此一案。可以知孟英之手眼通天。非幸獲虛名者所能仰望也。

胡秋紉。於酷熱時偶有不適。醫以柴葛香薷散之。反惡寒胸痞。更醫用枳朴檳椰以瀉之。勢日劇。延孟英視之。自汗不收。肢背極冷。奄奄一息。脈微無神。曰禀賦素虧。陽氣欲脫。此必誤認表證。使然與救逆湯加參耆服之。漸安。繼以補氣生津。調理匝月而痊。

陳妾。裝患淋久不愈。延至溽暑。邀孟英診之。曰易事耳。與補中益氣湯而愈。其子荷官。病痞積腹脹。發熱乾嗆。善食黃瘦。便溏

合觀二案其人必陰虛肺燥之質故用藥如此

溺赤兒科藥廣服無功已將絕望矣孟英聞而憐之曰吾於幼科雖未討論姑贈一方或有生機也以黃連白芍牡蠣鼈甲雞肫皮五穀虫霞天麴木瓜山查楝實橘皮桔梗旋覆巵子丹皮等藥投之一劑知旬餘愈

作痢疾治

段堯卿之太夫人患霍亂轉筋年踰七十矣孟英投自制連樸飲三啜而瘳霍亂案甚夥不遑廣采姑錄數則以示一斑

石誦羲室久患痰嗽諸醫藥之勿瘳孟英切其脈曰非傷風也與北沙參熟地百合麥冬貝母紫菀葳蕤枇杷葉鹽水炒橘皮燕窩一劑知數劑已初秋又患脘痛上及肩尖向以爲肝氣竄

服破削之品孟英曰亦非也以砂仁炒熟地炙橘紅楝實延胡枸杞當歸茯苓桑椹蒺藜為方服之良效繼即受孕矣

石芷卿患感張某連投柴葛藥熱果漸退而復熱之後勢更孔甚乃延孟英診為先以梔豉芩連等藥清解其升浮之熱倏邪歸於府脈來絃滑而實徑用承氣湯下之時其尊人北涯赴甌無人敢主其可服否也另招他醫決之以為太峻且腹不堅滿妄攻慮變舉家聞之揺惑暮夜復懇再診孟英辨論洋洋堅主前議服後果下黑矢次日大熱大汗大渴引飲孟英曰此府垢行而經熱始顯與竹葉石膏湯二劑而安繼以育陰充液調理

而康。

朱某患痢於越。表散湯滌滋膩等藥。備嘗之矣。勢瀕於危。始返杭乞孟英診之。神氣昏沈。耳聾脘悶。口乾身熱。環臍硬痛異常。瀉下五色者數十行。小溲澀痛。四肢抽搐。時時暈厥。曰。此暑溼之邪。失於清解。表散蕩滌。正氣傷殘。而邪乃傳入厥陰。再以滋膩之品補而錮之。遂成牢不可拔之勢。正虛邪實。危險極矣。與白頭翁湯加楝實蓯蓉芩連梔芍銀花石斛桑葉橘葉羚羊角牡蠣海蛇鱉甲鷄內金等藥。大劑頻灌。一帖而抽厥減半。四帖而抽厥始息。旬日後便色始正。溲漸清長。粥食漸進。半月後

臍間之硬始得盡消改用養陰調理踰月而康
鄰人汪氏婦之父王叟仲秋患痰嗽不食氣喘不臥囊縮便祕心搖搖不能把握勢極可危伊女浼家慈招孟英救之曰根蔕欲脫耳非病也以八味地黃湯去丹澤合生脈加紫石英青鉛龍牡胡桃肉楝實蓯蓉投之大解行而諸恙滅乃去蓯蓉麥冬服旬日以瘳初冬邵可亭患痰嗽面浮微喘醫謂年踰花甲總屬下部虛寒進以溫補納氣之藥喘嗽日甚口涎自流莖囊漸腫兩腿腫硬至踵不能稍立開口則喘逆欲死不敢發言頭仰則咳嗆咽疼不容略臥痰色黃濃帶血小溲微黃而長許芷卿

鷹孟英視之脈形絃滑有力曰此高年孤陽熾於內時令燥火
薄其外外病或可圖治眞陰未必能復且平昔便如羊矢津液
素乾再投溫補如火益熱矣乃以白虎湯合瀉白散加西洋參
貝母花粉黃芩大劑投之并用北梨擣汁頻飲潤喉以緩其上
僭之火數帖後勢漸減改投葦莖湯合清燥救肺湯加海蛇蛤
殼青黛勃臍竹瀝爲方句日外梨已用及百斤而喘始息繼加
此卻不必以病者嗜服也何不另用之
坎版鼈甲犀角而以豬肉湯代水煎藥大滋其陰而潛其陽火
始下行小溲赤如蘇木汁而諸證悉平下部之腫隨病遞消一
月已來共用梨二百餘斤矣適大雪祁寒更衣時略感冷風腹

中微痛自啜薑糖湯兩椀而喘嗽復作口乾咽痛大渴舌破仍不能眠復用前方以綠豆煎清湯代水煮藥始漸向安孟英謂其乃郎步梅曰內經云陰精所奉其人壽今尊翁陰液久虧陽氣獨治病雖去矣陰精非藥石所能繼續况年踰六秩長不勝消治病已竭人謀引年且希天眷予以脈察之終屬可虞毋謂治法不周贈言不早致有他日之疑成敗之論也

一賣酒人姓陸極窘而又遭顛沛久而患一異疾形消善饑蚤從皮膚而出搔之蠕蠕醫治莫效孟英診曰悲哀勞苦陽氣受傷麴蘖浸淫乃從虫化與補氣藥加杉木桑枝而愈亦理熱生虫之治法

陳芰裳之太夫人陡患嘔吐徹夜不止次早延孟英診之自述因寒而致孟英知芰裳進場家無主藥之人若明言屬熱必致畏藥不服矣漫應曰固寒也而疏方則芩連梔楝以大苦寒爲劑投之良愈

張鄭封室娩後即發熱服生化湯二帖熱益熾而發赤疹顧聽泉診之即與清解三劑不應欲進犀角地黃湯而恐病家之狃於產後以生疑也乃拉孟英質之診其脈弦滑而數面赤熱躁胸悶善悲肢腫而疼兩肘白疱如扁豆大者數十顆舌上亦有一顆痛礙水飲大便不解已旬日矣曰此不但胎前伏暑且有

藴毒而誤服生化湯以助其虐。幸初手卽用清解。尚不致於昏陷。犀角地黃。極是治法。猶恐不能勝任。乃與聽泉商加西洋參、滑石、知母、銀花、花粉、人中白、婁仁、竹黃、貝母、桑葉、卮子爲劑。其所親曰。高明斷爲熱證。何以病者雖渴而喜熱飲耶。孟英曰。此方中所以多用痰藥也。凡胸中有熱痰阻礙氣機者。每如是。不可以其向不吐痰而疑吾言之妄也。若因此而指爲寒證。則禍不旋踵矣。進四帖始得大解。頻吐稠痰。而各恙皆減。飲食漸加。孟英曰。病勢雖穩。餘熱尚熾。苟不亟爲清滌。而遽投補益。猶有尋損之虞。其母家果疑藥過寒涼。必欲招專科調治。幸將前方

示彼尙不妄施温補然隔鞾搔癢紀律全無旬日後餘火復燃鄭封堅懇孟英設法仍用甘寒療之周身膚蛻如蛇皮爪甲更新其病之再生也可知繼與滋補眞陰而起

棊書三患欬逆上氣頭偏左痛口渴不饑便溏如水王瘦石薦孟英視之曰此肝陰胃汁交虛時令燥邪外薄與育陰息風清燥滋液之法日以漸安服及兩月大解反形乾結而痊

鄭某吐血盈椀孟英脈之右關洪滑自汗口渴稍一動搖血卽上溢人皆慮其脫意欲補之孟英曰如脫惟我是問與白虎湯加西洋參大黃炭一劑霍然

季秋顧聽泉邀孟英視康康侯副轉之恙切其脈滑數而右歇左促且肝部間有雀啄氣口又兼解索望其面宛如薰黃頭汗自出呼吸粗促似不接續坐臥無須臾之寧便溺澀滯渾赤極臭心下堅硬拒按形若覆椀觀其舌色邊紫苔黃殊不甚乾燥問其所苦曰口渴甜膩不欲飲食苟一合眼卽氣升欲喘煩躁不能自持胸中懊憹莫可言狀孟英曰此由溼熱誤補漫無出路充斥三焦氣機爲其阻塞而不流行蔓延日久津液爲之凝滯而成痰飲不啻人禽雜處莠莠同疇邪正混爲一家醫見肢冷自汗不知病由壅閉而然欲以培正而邪氣方張得補反爲

樹幟豈非賫寇兵而齎盜糧哉非其類者鋤而去之乃爲喫緊之治聽泉曰良是也夏閒起病閒白心悸少寐楊某以爲虛而補之時尙出差辦事暑溼外侵受而不覺迨闈差未竣其病斯發而諸醫之藥總不外乎溫補一途以致愈補愈劇今擬溫膽法待君可否孟英曰脈證多怪皆屬於痰今胸痞如斯略無痰吐蓋由痰能阻氣氣不能運痰耳宜於溫膽中加薤白蔞仁通其胸中之陽又合小陷胸爲治飲痞之聖法參以梔豉泄其久鬱之熱以除懊憹佐以蘭草滌其陳腐之氣而醒脾胃聽泉深然之連投二劑各恙皆減脈亦略和而病者以爲旣係實證何

妨一瀉而去之連服大黃丸二次承氣湯半帖孟英急止之曰畏虛進補固非欲速妄攻亦謬蓋溼蒸爲熱灼液成痰病非一朝一夕而成治以上下分消爲是不比熱邪傳府可一蕩而愈也越日下部果漸腫孟英曰攻痞太速之戒古人不我欺也與聽泉商以前法加黃芩合瀉心意再配雪羹投之痰果漸吐痞亦日消而自腹至足以及莖囊腫勢日加孟英謂勢已如此難以遽消但從三焦設法則自上而下病必無虞與聽泉商用河間桂苓甘露飲意而姚平泉孝廉力主崇土勝溼之法深以寒凉爲不可用衆議仍投前日之藥孟英曰前藥原可服也嫌力

不足耳次日痰中帶血甚多孟英曰浮熱薰蒸不已自氣及營矣與聽泉暨王子能參軍商以知檗生地犀角鱉甲白芍苡仁貝母石斛茅根麥冬滑石梔子藕汁童溺投之而止踰數日又吐且肢冷自汗心餒畏胱姚平泉謂氣不攝血當主歸脾湯以統之舉家皇皇連請診脈者三次孟英曰脈來屢變陳芷之江所以不能指實其病而楊阮諸人皆疑爲大虛之候也然望聞問切不可獨憑於指下今溲如赭石湯渾赤有腳其爲溼熱之病昭昭若揭初傷於氣分則津液受灼以爲痰漸及於營分則陰血不安而妄溢邪氣內盛豈非病實而眞實類虛吾不受病之

前云不可妄攻此又投峻下之劑何也蓋前徒攻其熱故不中病而致生他證此則直攻其痰始能與病相當也

歟也○堅守前議靜鎮不搖○服二劑果止○孟英曰○血之復吐也○由於氣分之邪以擾及也○欲清氣道之邪○必先去其邪所依附之痰○蓋津液既為邪熱灼爍以成痰○而痰反即為邪熱之山險也○不妨峻攻其實而緩行其勢○初進滾痰丸三錢○得下泄氣一次○副轉云四十日來未有之通暢也○連投數日○始解膠痰黑矢多遍○而小溲亦漸清長○苔色亦退○寢食遂安○惟下部之腫猶爾也○馬香崖陸虛舟皆主實脾行水之法○孟英曰○諦參脈證○病不在脾○況善饑便燥○口渴溺多○吾方慮轉消證○亟投甘潤之不遑○惡可滲利傷陰○補土劫液耶○且脾虛下陷之腫○與溼盛而腫之腫

其膝之上下內外形勢必然相貫今膝之上下內外凹凸迥判毫不毗連蓋由溼熱所釀之痰飲既誤補而痞塞中焦復妄攻以流竄隧絡所謂不能一蕩而蹦勢必旁趨四射吾當以法取之會又咳痰帶血而精神食飲如常孟英曰無恐也此乃前次晒三七太多兜澀留瘀最不宜用吐而去之極妙但須金水同治冀咳止而血絡不震動為要耳與甘露飲加藕汁童溺服之四劑而止咳嗽亦寧於是專治其下部之腫以固本加知蘗貝母花粉旋復楠絡絲瓜絡羚羊角楝實葱鬚豆卷薏苡竹瀝出入為劑二三帖間其高突隆腫之處即覺甚癢搔之水出如汗

而作慹氣六七日後兩腿反覺乾瘦燥痛莖囊亦隨之而消矣

孟英曰用此潤藥消腫尚且乾痛咽燥設從他議而投燥脾利水之法更當何如哉蓋寒溼則傷陽熱溼則傷陰血液皆陰也善後之法還宜滋養血液稍佐竹瀝以搜絡中未淨之痰使愈後不爲他日之患更屬法中之法服之飲食中節便溺有權幸無消渴之虞而竟愈焉

廣孔愚司馬久患溏泄而舌黑氣短自春徂冬治而不效孟英視之曰勞心太過陽爍其陰人見其溏泄輒與溫中不知肺受火刑氣失清肅而短促於上則水源不生自然溺少便瀉矣投

以肅肺淸心凉肝滋腎之法果得漸瘳。

周菊生令正患少腹瘕墜小溲頻數而疼醫投通利不效繼以升提溫補諸法備試至於不食不寐大解不行口渴不敢飲水。聞聲卽生驚悸孟英脤之曰厥陰爲病也不可徒治其太陽先與鹹苦以泄其熱續用甘潤以滋其陰毫不犯通滲之藥而愈。

王氏醫案卷二終

